

OPTIMAX[®] 200 SC

Nº de Registro: PQUA Nº 1461 - SENASA
Fecha de actualización: 25 junio 2024
Versión: 02

Ingrediente Activo: Fipronil

Formulación:

Suspensión Concentrada (SC): Contiene 200 gramos de ingrediente activo por litro de producto formulado.

Propiedades físicas y químicas

Nombre Común: Fipronil


Nombre Químico: Chemical name (IUPAC): (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-
α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl-
pyrazole-3-carbonitrile

Fórmula Empírica: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄O

Peso Molecular: 437.15

Presión de Vapor: 2 x 10⁻⁶ Pa at 25 °C

Fórmula Estructural:



Inflamabilidad: No Inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

Características Generales:

OPTIMAX 200 SC es un insecticida del grupo de los Fenilpyrazoles, con efecto de contacto e ingestión y que actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos. Es un insecticida de muy baja toxicidad para los mamíferos y para los usuarios, tiene muy buena acción residual y proporciona un tiempo prolongado de efectivo control de las plagas. Los insectos cesan su actividad inmediatamente después de haber entrado en contacto con el producto.

Modo de acción:

OPTIMAX 200 SC es un insecticida neurotóxico que interviene a nivel de la transmisión nerviosa post sináptica. Inhibe el flujo de iones de cloro hacia el interior de la neurona. Este flujo es normalmente regulado por el receptor del

CAPEAGRO S.A.C.

Av. Benavides 2150. Of. 803. Miraflores, Lima 18, Perú. Telf.: 4455346
www.capeagro.com e-mail: administracion@capeagro.com

ácido gamma amino butírico (GABA). El Fipronil se asocia con el receptor de GABA y limita el ingreso de los iones cloro, inhibiendo de esta manera la transmisión nerviosa, lo cual en el caso de los insectos se traduce en convulsiones, provocándole la muerte.

Usos y Dosis recomendadas:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plaga		Dosis		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	L/Cil	L/ha		
Cebolla	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.2 - 0.25	0.6 - 0.78	21	0.02
Arroz	"Mosca minadora"	<i>Hydrellia wirthi</i>	-	0.3	51	0.01
Vid	"trips del maíz"	<i>Frankliniella occidentalis</i>	0.2 - 0.25	--	60	0.005

* PC: Periodo de Carencia ** LMR: Límite máximo de residuos

Época y frecuencia de aplicación:

Realizar la aplicación cuando la plaga esté presente considerando el umbral de daño económico.

Compatibilidad:

OPTIMAX 200 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con productos de reacción alcalina. En caso de utilizarlo en mezclas se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad.

Fitotoxicidad:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

pH óptimo:

Para que el producto actúe eficientemente recomendamos que el pH del agua esté entre 5-7.

Nº de Registro: PQUA Nº 1461-SENASA

Categoría toxicológica: Moderadamente Peligroso

Titular del Registro: CAPEAGRO S.A.C.



Av. Benavides 2150. Oficina 803. Telf.: 445-5346
Miraflores – Lima
www.capeagro.com

CAPEAGRO S.A.C.

Av. Benavides 2150. Of. 803. Miraflores, Lima 18, Perú. Telf.: 4455346
 www.capeagro.com e-mail: administracion@capeagro.com