

SuperCaB

Fecha de actualización: 7 de agosto de 2024

Versión: 02

SUPER CaB es un fertilizante foliar diseñado con Nanotecnología que contiene una alta concentración de Calcio y Boro, ideal para cubrir las demandas de estos elementos. Adecuado para tratamientos preventivos y curativos frente a la demanda de calcio y boro en todos los cultivos. La aplicación regular con **SUPER CaB** nos da los siguientes beneficios:

1. Mejora la calidad, firmeza y vida de anaquel de la mayoría de los vegetales.
2. Reduce o elimina muchos desórdenes fisiológicos.
3. Material fundamental en la estructura de la pared celular.
4. Promueve la floración y desarrollo de los frutos.
5. Regula el balance de intercambio de otros nutrientes esenciales.
6. Mejora la resistencia a las enfermedades.
7. Ayuda a la recuperación de la planta del estrés

Es compatible con la mayoría de herbicidas, insecticidas y fungicidas.

COMPOSICION:

Elemento	Concentración
Calcio	22.0%
Boro	3.8%
Aminoácidos	5.0%
Aditivos	69.2%

FORMAS DE APLICACIÓN:

APLICACIÓN FOLIAR: Diluir en agua de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta para aplicaciones foliares. El momento óptimo de aplicación esta desde inicio de brotamiento y/o inicio de floración con intervalos entre 7 a 15 días entre aplicación. Para mejores resultados, aplicar durante el crecimiento activo del cultivo, después de un riego y programar la aplicación por la mañana o en la tarde.

DOSIS: APLICACION FOLIAR:

Cultivo	Dosis/ha (suelo)	Dosis Cil (200L)	Forma y momento de aplicación
Arroz trigo	50 – 125 g	50 g	Aplicar en punto de algodón, repetir al inicio del espigado y en pleno desarrollo del grano.
Leguminosas	50 – 125 g	50 g	Aplicar en el inicio de floración y repetir durante el llenado de grano.
Maíz, sorgo, caña	50 – 125 g	50 g	Aplicar 20 días después de la germinación
Capsicum (Ají, pimiento, páprika)	50 – 125 g	50 g	Aplicar desde el inicio de floración, hasta la salida del cultivo en intervalos de 15 a 21 días.
Papa	50 – 125 g	50 g	Aplicar al inicio de la germinación.
Frutales	125 – 250 g	50 g	Aplicar antes de la floración repetir la aplicación en pleno cuaje de frutos.
Cebolla, ajo	50 – 125 g	50 g	Aplicar durante el pre bulbeo.
Cucurbitáceas	50 – 125 g	50 g	Aplicar desde el inicio de floración, hasta la salida del cultivo en intervalos de 15 a 21 día.

INSTRUCCIONES DE USO:

La frecuencia de aplicación variara de acuerdo a la severidad de la deficiencia, clima, tipo de suelo y método de aplicación. Como recomendación general programar aplicaciones pre floración y repetir entre los 7 a 15 días entre aplicación.

CULTIVOS: Aplicable para todos los cultivos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugares frescos, lejos de la luz solar directa. Puede ser almacenado en un lugar sin calefacción.

PRECAUCION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



Av. Benavides 2150. Oficina 803. Telf: 445-5346
 Miraflores – Lima

www.capeagro.com