

Vigor

Fecha de actualización: 7 de agosto de 2024

Versión: 02

VIGOR es un bioestimulante orgánico con vitaminas, minerales, aminoácidos, hormonas vegetales, betainas, ácido algínico, antioxidantes todos en su forma natural y materia orgánica como componente principal. **VIGOR** es eficaz en todas las etapas fisiológicas del cultivo y el resultado es visible en cada etapa de crecimiento del cultivo primordialmente medido con el rendimiento. Entre las ventajas del producto esta:

1. Ayuda a un rápido desarrollo del sistema radicular que permite a la planta absorber los nutrientes de manera más eficiente.
2. Aumenta la actividad enzimática mejorando así la utilización de nutrientes por la planta.
3. Aumenta el crecimiento de las raíces y desarrollo de brotes.
4. Favorece la floración y amarre de frutas.

Es compatible con la mayoría de herbicidas, insecticidas y fungicidas.

COMPOSICION:

Elemento	Concentración
Potasio (K)	7.5%
Hierro (Fe)	1.2%
Zinc (Zn)	1.2%
Manganeso (Mn)	1.0%
Boro (B)	0.4%
Cobre (Cu)	0.2%
Molibdeno (Mo)	0.01%
Ácido algínico	2.5%
Total materia orgánica	42.3%

FORMAS DE APLICACIÓN:

APLICACIÓN FOLIAR: Diluir en agua de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta para aplicaciones foliares. Iniciar la aplicación posterior al trasplante y repetir en la etapa vegetativa, pre y floración plena y desarrollo

del fruto. Podemos repetir las aplicaciones con intervalos de 15 a 20 días entre aplicación.

RIEGO POR GOTEO: Disolver el producto y aplicar en todas las etapas del cultivo con intervalo de 30 días entre 2 aplicaciones.

DRENCH: Disolver y aplicar por drench en todas las etapas del cultivo.

VOLEO. Ideal para aplicar junto al primer abono al pie de la planta como un suplemento adicional a fin de estimular un vigoroso crecimiento radicular. También mezclar con fertilizante y poder volear directo al campo en el caso de arroz y otros cultivos.

DOSIS:

Cultivo	Dosis foliar/ha	Dosis suelo/ha	Dosis Cil (200L)	Forma y momento de aplicación
Arroz	0.25 – 0.5 Kg	0.5 – 1 Kg	0.25 Kg	Impregnación de semilla (100 g por 50 kg de semilla). Aplicar al inicio del macollamiento y repetir la aplicación 20 días después.
Trigo				Impregnación de semilla (100 g por 50 kg de semilla). Aplicar al inicio del macollamiento y repetir la aplicación 20 días después.
Capsicum (Ají, pimiento, páprika)				Aplicar al suelo al momento del trasplante. Aplicar al inicio de la floración, repetir la aplicación 15 días después vía foliar.
Maíz				Impregnación de semilla (100 g por bolsa de semilla). Aplicar vía foliar en V3 y repetir la aplicación en V 10.
Leguminosas				Impregnación de semilla (100 g por 50kg de semilla). Aplicar al inicio de la floración.
Frutales				Aplicar al suelo para fomentar el desarrollo de raíces, de preferencia al inicio de una nueva campaña. Aplicar después de la poda a un brote de 10 centímetros. Repetir la aplicación en plena floración.
Cebolla ajo				Aplicar al suelo después del trasplante
Cucurbitáceas				Aplicar después del trasplante y repetir la aplicación en floración
Papa				Aplicar al inicio de la germinación

INSTRUCCIONES DE USO:

La frecuencia de aplicación variara de acuerdo a la severidad de la deficiencia, clima, tipo de suelo y método de aplicación.

CULTIVOS: Aplicable para todos los cultivos como hortalizas, frutales y leguminosas.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugares frescos, lejos de la luz solar directa. Puede ser almacenado en un lugar sin calefacción.

PRECAUCION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



Av. Benavides 2150. Oficina 803. Telf: 445-5346
 Miraflores – Lima
www.capeagro.com