

ZULU 500 EC

Nº de Registro: PQUA Nº 1673 - SENASA

Fecha de actualización: 11 de julio de 2024 **Versión:** 02

Ingrediente Activo: Difenoconazole 25% + Propiconazole 25%

Formulación: Concentrado emulsionables (EC): Los ingredientes activos del fungicida ZULU 500 EC está en una proporción de 250 gramos por Kg de Propiconazole + 250 gramos por Kg de Difenoconazole de producto formulado peso/volumen.

Propiedades físicas y químicas

Nombre Común: Difenoconazole

Nombre Químico: 3-chloro-4-[(2*RS*,4*RS*;2*RS*,4*SR*)-4-methyl-2-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chloro phenyl ether


Fórmula Empírica: $C_{19}H_{17}Cl_2N_3O_3$

Peso Molecular: 406.3 g/mol

Presión de Vapor: 6.6×10^{-8} Pa (20°C)

Coefficiente de partición n-octanol/agua: Log Kow = 4.2 (20°C, pH 7.0)

Fórmula Estructural:



Nombre Común: Propiconazole


Nombre Químico: (2*RS*, 4*RS*;2*RS*,4*SR*)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)4propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1*H*-1,2,4-triazole (IUPAC)

Fórmula Empírica: $C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$

Peso molecular: 342.2 g/mol

Presión de Vapor: 0.056 mPa, Volatil (20°C)

Coeficiente de partición n-octanol/agua: Log Kow = 3.72 (20°C, pH 7.0)
 Fórmula Estructural:



Características Generales:

Es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles, que posee doble efecto que permite un rápido barrido de la enfermedad y un efecto prolongado. Se destaca por su intensa translocación translaminar (del haz al envés de las hojas o viceversa) con acción preventiva, curativa y erradicante contra un rango amplio de enfermedades aéreas causadas por hongos de importancia económica de las órdenes Ascomicetos, Basidiomicetos y Deuteromicetos.

Modo de acción:

ZULU 500 EC, actúa en el hongo sobre la formación del Ergosterol, componente indispensable para la formación de la pared celular deteniendo del crecimiento del tubo germinativo, lo que impide la invasión en el tejido de las hojas. Actúa primordialmente en el desarrollo de las hifas secundarias del patógeno dentro de los tejidos de la planta pero también lo hace, en menor escala, sobre el desarrollo y virulencia de las conidias de los hongos. Las características Físico Químicas de cada ingrediente activo permiten que el control de la enfermedad sea de choque y además por un tiempo prolongado.

Usos y Dosis recomendadas:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre Científico	L/200L de agua	L/ha		
Esparrago	"Roya"	<i>Puccinia asparagi</i>	-	0.4	20 (Difeconazole) 30 (Propiconazole)	0.03 (Difeconazole) 0.05 (Propiconazole)

Arroz	"Pyricularia"	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.2	28 (Difeconazole) 30 (Propiconazole)	3.0 (Difeconazole) 1.5 (Propiconazole)
-------	---------------	---------------------------	---	-----	---	---

* PC: Periodo de Carencia ** LMR: Límite máximo de residuos

Época y frecuencia de aplicación:

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para la aparición de la enfermedad.

Incompatibilidad:

Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. Sin embargo, antes de aplicar en mezcla efectúe una prueba a pequeña escala.

Fitotoxicidad:

No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda, si se siguen las instrucciones recomendadas.

pH óptimo:

Para que el producto actúe eficientemente recomendamos que el pH del agua esté en 5.5-6.

Nº de Registro: PQUA Nº 1673-SENASA

Categoría toxicológica: Ligeramente Peligroso Titular del

Registro: CAPEAGRO S.A.C.



**Av Benavides 2150. Of. 803. Telf.: 445-5346
Miraflores – Lima**

www.capeagro.com

CAPEAGRO S.A.C.

Av. Benavides 2150. Of. 803. Miraflores, Lima 18, Perú. Telf.: 4455346
www.capeagro.com e-mail: administracion@capeagro.com