

## FICHA TÉCNICA

# FungiBlock

**FUNGIBLOCK** es un potente activador de mecanismos de defensas naturales de las plantas que frenan los ataques de hongos fitopatógenos. Ha sido preparado con ingredientes de extractos botánicos que tienen la capacidad de activar mecanismos de defensa los cuales bloquean y controlan hongos fitopatógenos mostrando alta efectividad después de la aplicación. FUNGIBLOCK ha sido eficazmente probado en diversos tipos de enfermedades fungosas mostrando una alta actividad contra un amplio espectro de hongos que comúnmente atacan cultivos de hortalizas, frutas y flores.

### COMPOSICIÓN:

Elemento	Concentración
Consorcio de Extractos vegetales	25.0 %
Emulsificantes Orgánicos	10.0 %
Adyuvante	c.s.p. 100%

### BENEFICIOS DEL USO DE FUNGIBLOCK:

1. Activa los sistemas de defensa de las plantas para combatir diferentes patógenos.
2. Previene el crecimiento del micelio y la formación del tubo germinativo del patógeno.
3. Reduce el número de esporas de hongos después del tratamiento.
4. No afecta a polinizadores y no tiene efectos dañinos al medio ambiente.

### COMO TRABAJA FUNGIBLOCK:

Al cubrir toda la superficie de la planta, poco después de la aplicación se activa el sistema de resistencia adquirida (SAR) y comienza la inhibición de la esporulación del patógeno, en consecuencia detiene la propagación de enfermedades como: roya, Oidiosis, Tizón temprano/tardío, Botrytis, Manchas foliares y Antracnosis.

### RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	DOSIS POR CILINDRO (L/cil)	FORMA Y MOMENTO DE APLICACIÓN	P.C.	L.M.R
<b>ARÁNDANO</b>	0.4 - 0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente; Oidio ( <i>Microsphaera vaccinii</i> y <i>Erysiphe vaccinii</i> ), Alternaria ( <i>Alternaria</i> sp), Botrytis ( <i>Botrytis cinerea</i> ), Roya ( <i>Naohidemyces vaccinii</i> )	N.A	N.A
<b>VID</b>	0.4 - 0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente; Oidio ( <i>Erysiphe necator</i> ), Botrytis ( <i>Botrytis cinerea</i> ).	N.A	N.A
<b>CÁPSICUM (AJÍ, PIMIENTO, PÁPRIKA)</b>	0.4 - 0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente; Oidio ( <i>Leveillula taurica</i> ).	N.A	N.A
<b>ESPÁRRAGO</b>	0.4 - 0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente; Roya ( <i>Puccinia asparagi</i> ).	N.A	N.A
<b>PALTO</b>	0.4 - 0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente Cladosporium.	N.A	N.A
<b>ALCACHOFA</b>	0.4 - 0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente; Oidio, Botrytis y Sclerotinia.	N.A	N.A
<b>CUCURBITÁCEAS (SANDÍA, MELÓN, PEPINILLO, ZAPALLO)</b>	0.4 - 0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente; Oidio.	N.A	N.A
<b>FRESA</b>	0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente Botrytis.	N.A	N.A

### RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar ECODEFENSE utilizando el coadyuvante NUTRIWET SILICONADO y equipo motorizado para garantizar una óptima cobertura y buen mojado del producto. Las aplicaciones deben realizarse durante las primeras horas de la mañana, en las horas de menor intensidad lumínica al final del día o durante la noche, lo que asegura una mejor adherencia y efectividad del tratamiento sobre la estructura vegetal.

### COMPATIBILIDAD:

**FUNGIBLOCK** no es compatible con fungicidas a base de azufre, cobre y caldo bordelés.

### ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugares frescos, lejos de la luz solar directa. Puede ser almacenado en un lugar sin calefacción.