

Usos y recomendaciones

Manejo
fitosanitario
y nutricional
Vid



	Post cosecha	Yema Hinchada	Brote 3 - 20 cm	Brote 50 cm	Pre Floración 100 cm	Flor	Baya 3 - 6 mm	Baya 7 - 16 mm	Cierre Racimo	Pinta	Cosecha
"Araña Roja" (Tetranychus urticae)			CARABIN®	ACARMAX®	Hexyfen®						
"Ácaro de la yema" (Colomerus vitis)				ABECTINA®							
"Trips" (Thrips tabaci)					Capemil®	PIROXI/MAX®	GUERRER®	ESPINEL			
"Chanchito blanco" (Planococcus citri)			Doppier®	Superdor Maxx®	SuperAct®	Bomber Ultra 240 OD	GENDARME MAXX®	BOMBER® 150 OD			
"Eumorpha" (Eumorpha vitis)			CUMPLIDOR®								
"Nematodes" (Meloidogyne incognita)		Nematofin 10 CS	NEMABEC®								
"Oidium" (Erysiphe necator)	Kremex®	SANTIAMEN	Supercur®	Supertrobin®	MICLONIL®	FAITER®	ESTELMAX®	Resguard® 500 SC	BOSCAPYR® 370 WG		
"Mildiu" (Plasmopara viticola)	TALOXYL GOLD®	FITOMAX®	Falumin®	FUNGIMYL® 450 SC							
"Botritis" (Botrytis cinerea)						CAPELLAN	KASKO® 50		PREVENGO®		
"Muerte regresiva" (Lasiodiplodia theobromae)		Superaz®	PROTEXAZOL®								
Malezas	HERBAGLIF®	Cuanjic®									
Reguladores de crecimiento							AGROGIBB®				
Acondicionadores de suelo		NANORRHIZA *		NANO HUMIC *							
Nutri-protección		EferSil *		NÓ FUNGUS OOMY *		NÓ FUNGUS ASCO *		BIOSTOP *		NO+MINADOR *	
Bioestimulantes	ECKLOMAX *	Nano PGP *	Vigor *	AminoPower *	FloriMax *	FlorControl *					
Nutrientes		Nano Balance Nutrition		NANO Mg *	SuperCaB *	NANO Zinc *	Nano fert 19-19-19 *	Nano fert 13-00-45 *		Nano fert 00-00-50 *	
		Nano fert 14-40-00		Nano fert 00-50-30	BioNutrient HIERRO 10%	FERROFORTE HIERRO 6%					
Floración y cuajado					FloriMax *	FlorControl *	Frutigross *				



Utilizar en todas sus aplicaciones el



de acuerdo a las recomendaciones de uso.



(Potencia y acelera la acción de los agroquímicos).

(*)

Línea nutricional



(**)

BIOSTOP (Nutriente foliar con efecto protector antifúngico).

