

NO+ VIRUS

Fecha de actualización: 08 de agosto de 2024

Versión: 02

NO +VIRUS es una combinación de extractos vegetales que induce una resistencia natural de la planta frente a al ataque de los virus. Favorece un desarrollo vigoroso del cultivo.

NO +VIRUS es un producto orgánico de amplio espectro que protege la planta de los virus y también mejora la resistencia contra ellos.

NO +VIRUS ingresa a la planta a través de la abertura estomática y se moviliza por la planta a través de los haces vasculares. Al ingresar a la célula de la planta afectada encapsula las partículas del virus. Abre los tejidos conductivos bloqueados por las partículas de virus y las células de la planta comienzan a recuperarse, produciéndose nuevas hojas libres de virus. Es efectivo hasta 15 días después de la aplicación.

COMPOSICION:

Elemento	Concentración
Consorcio de Extractos vegetales	5.0 %
Disolventes y estabilizadores	1.2 %
Solventes acuosos	93.8 %

FORMAS DE APLICACIÓN:

DOSIS Y RECOMENDACIONES PARA APLICACIONES FOLIARES: Diluir en agua de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta para aplicaciones foliares.

Cultivo	Problema	Dosis por Ha	Dosis por Cil	P.C.	LMR
Arroz	Se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo 1. Aplicar en almácigo a una dosis de 1 L/Cil. 2. Aplicar de manera preventiva al inicio del macollamiento a 0.5 L/Cil y repetir cada 20 días. 3. Aplicar de manera curativa 1 L/Cil al momento de identificar sintomatología de virosis en el cultivo, repetir 2 veces cada 7 días	1 – 2 L	0.5 – 1 L	N.A.	N.A.
Capsicum (Pimiento, Ají, Páprika)	Se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo. 1.-Aplicar en vivero una semana antes de la siembra a una dosis de 1 L/cil. 2.-Aplicar 20 días después de la siembra a una dosis de 1 L/cil. 3.-Aplicar al inicio de la floración 4.-Aplicar en pleno cuaje de frutos. 5.-Aplicar durante el llenado de fruto.	1 – 4 L	1 L	N.A.	N.A.
Cítrico (Mandarina, limón, naranja)	Aplicar al momento de la aparición de la sintomatología de "virois", repetir la aplicación a los 7 días.	1 – 4 L	0.5 – 1 L	N.A.	N.A.
Papaya	Aplicar al momento de la aparición de la sintomatología de "virois", repetir 3 veces la aplicación cada 7 días. 1.- Aplicar de manera 0.5 L/Cil cada 21 días.	1 – 4 L	0.5 – 1 L	N.A.	N.A.
Palta	Aplicar al momento de la aparición de la sintomatología de "virois", repetir 3 veces la aplicación cada 7 días. 1.- Aplicar de manera 0.5 L/Cil cada 21 días.	1 – 4 L	0.5 – 1 L	N.A.	N.A.
Uva	Aplicar al momento de la aparición de la sintomatología de "virois", repetir 3 veces la aplicación cada 7 días. 1.- Aplicar de manera 0.5 L/Cil cada 21 días.	1 – 4 L	0.5 – 1 L	N.A.	N.A.
Maracuyá	Aplicar al momento de la aparición de la sintomatología de "virois", repetir 3 veces la aplicación cada 7 días. 1.- Aplicar de manera 0.5 L/Cil cada 21 días.	1 – 2 L	0.5 – 1 L	N.A.	N.A.
Cucurbitáceas (sandía, melón, zapallo)	Aplicar al momento de la aparición de la sintomatología de "virois", repetir 3 veces la aplicación cada 7 días. 1.- Aplicar de manera 0.5 L/Cil cada 21 días.	1 – 4 L	0.5 – 1 L	N.A.	N.A.
Papa	Aplicar al momento de la aparición de la sintomatología de "virois", repetir 3 veces la aplicación cada 7 días. 1.- Aplicar de manera 0.5 L/Cil cada 21 días.	1 – 2 L	0.5 – 1 L	N.A.	N.A.
Arándano	Aplicar al momento de la aparición de la sintomatología de "virois", repetir 3 veces la aplicación cada 7 días. 1.- Aplicar de manera 0.5 L/Cil cada 21 días.	1 – 4 L	0.5 – 1 L	N.A.	N.A.

INSTRUCCIONES DE USO:

La frecuencia de aplicación variara de acuerdo a la severidad del ataque, clima, tipo de suelo y método de aplicación.

CULTIVOS: Aplicable para todos los cultivos como hortalizas, frutales y leguminosas.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugares frescos, lejos de la luz solar directa. Puede ser almacenado en un lugar sin calefacción.

PRECAUCION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



Av. Benavides 2150. Oficina 803.

Telf: 445-5346 Miraflores – Lima

www.capeagro.com