# FAITER® 75 WG

**Nº de Registro:** PQUA Nº 1696 - SENASA
**Fecha de actualización:** 09 octubre 2026
**Versión:** 02.0

**Ingrediente Activo:** Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%
**Categoría toxicológica:** Ligeramente Peligroso


**Formulación:** Gránulos Dispersables (WG): Los ingredientes activos del fungicida **FAITER 75 WG** está en una proporción de 500 gramos por Kg de Tebuconazole + 250 gramos por Kg de Trifloxystrobin de producto formulado peso/volumen.

**Propiedades físicas y químicas:**

| | |
|---|---|
| Nombre Común: | Tebuconazole |
| Nombre Químico: | (*RS*)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1*H*-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol (IUPAC) |
| Fórmula Empírica: | $C_{16}H_{22}ClN_3O$ |
| Peso Molecular: | 307.81 g/mol |
| Presión de Vapor: | 1.3 x $10^{-3}$ mPa (20°C) |
| Solubilidad en agua: | 36 mg/l, baja (20 °C, pH 7.0) |

Coeficiente de partición n-octanol/agua: Log Kow = 3.7 (20°C, pH 7.0)


Fórmula Estructural:




| | |
|---|---|
| Nombre Común: | Trifloxystrobin |
| Nombre Químico: | Methyl (2Z)-2-methoxyimino-2-[2-[[(E)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylideneamino]oxymethyl]phenyl]acetate (IUPAC) |
| Fórmula Empírica: | $C_{20}H_{19}F_3N_2O_4$ |

Peso Molecular: 408 g/mol
Presión de Vapor: 3.4 x $10^{-3}$ mPa (20°C)
Solubilidad en agua: 0.61 mg/l, baja (20 °C, pH 7.0)
Coeficiente de partición n-octanol/agua: Log Kow = 4.5 (20°C, pH 7.0)

Fórmula Estructural:




**Características Generales:**
**FAITER 75 WG** es un fungicida foliar de acción sistémica y mesostémica. Tiene una alta proporción de Tebuconazole que le permite tener un alto poder de stop de las enfermedades presentes y el Trifloxistrobin que le confiere la residualidad necesaria.
El producto es absorbido rápidamente por hojas y tallos verdes, y es redistribuido por toda la planta.

**Modo de acción:**
El Tebuconazole es incorporado a la planta y distribuido en forma ascendente (acropetala). Actúa sobre los hongos patógenos durante la penetración y formación de haustorios. Detiene el crecimiento del hongo interfiriendo la biosíntesis de sus membranas celulares (Biosíntesis de Ergosterol). Tiene una acción preventiva y fuertemente curativa.
El Trifloxistrobin tiene una actividad mesostémica o efecto cuasi-sistémico, que se caracterizada por una alta afinidad con la superficie de la planta, absorción en la capa cerosa de las hojas y una penetración en el tejido vegetal con movimiento translaminar. Trifloxystrobin es particularmente activo sobre la germinación de esporas y el crecimiento del micelio en la superficie de la planta. Inhibe también el desarrollo de patógenos, como la formación de haustorios en la epidermis del tejido vegetal

**Usos y Dosis recomendadas:**

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

| Cultivo | Enfermedad | | Dosis | | PC* (días) | LMR** (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre común | Nombre Científico | Kg/ha | % | | |
| Pimiento | "Oidium" | *Leveillula taurica* | 0.25 | - | 7 | 1.0 Tebuconazole<br>0.3 Trifloxystrobin |
| Vid | "Oidium" | *Erysiphe necator* | 0.3 - 0.375 | - | 35 | 6.0 Tebuconazole<br>3.0 Trifloxystrobin |
| Mango | "Antracnosis" | *Colletotrichum gloeosporioides* | - | 0.025-0.030 | 14 | 0.1 Tebuconazole<br>0.01 Trifloxystrobin |

*** PC:** Periodo de Carencia **** LMR:** Límite máximo de residuos

**Época y frecuencia de aplicación:**
Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo o cuando las condiciones medio ambientales sean favorables para la aparición de la enfermedad.

**Incompatibilidad:**
**FAITER 75 WG** es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. No aplicar en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo. No hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo.

**Fitotoxicidad:**
No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

**pH óptimo:**
Para que el producto actúe eficientemente recomendamos que el pH del agua esté en 6.

capeagro
Mejor nutrición, mayor protección.

**Av Benavides 2150 Oficina 803. Telf: 445-5346**
**Miraflores – Lima**

**www.capeagro.com**