FungiBlock

Fecha de actualización: 28 de mayo de 2026
Versión: 03.0

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ingrediente activo: Extracto de aceite de tomillo
Grupo: Protección vegetal
Formulación: Concentrado Emulsionable

2. DESCRIPCION DE PRODUCTO

FUNGIBLOCK es un potente inductor de defensas vegetales formulado a base de extracto de aceite de tomillo (*Thymus vulgaris*). Su alto contenido de metabolitos secundarios terpénicos presenta una fracción de fenoles y monoterpenos que otorga una activación del sistema inmune de la planta.

Su aplicación estimula la Resistencia Sistémica Adquirida (SAR) y la Resistencia Sistémica Inducida (ISR), preparando al cultivo para bloquear y controlar el ataque de hongos fitopatógenos. Al lograr una cobertura foliar completa, **FUNGIBLOCK** frena el crecimiento micelial e inhibe la esporulación, deteniendo eficazmente la propagación de enfermedades en cultivos de hortalizas, frutales y ornamentales.

COMPOSICIÓN:

Elemento	Concentración
Consorcio de Extractos vegetales	25.0 %

3. BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Activa los sistemas de defensa de las plantas para combatir diferentes patógenos.
- Previene el crecimiento del micelio y la formación del tubo germinativo del patógeno.
- Reduce el número de esporas de hongos después del tratamiento.
- No afecta a polinizadores y no tiene efectos dañinos al medio ambiente.

4. CUADRO DE USOS

Cultivo	Dosis (L/Cil)	Forma y momento de aplicación	PC	LMR
Arándano	0.4 -0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente oidiosis, manchas foliares, hongos de madera y botritis.	N.A	N.A
Vid	0.4 -0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente oidiosis, hongos de madera y botritis.	N.A	N.A
Capsicum (Ají, pimiento, paprika y otros)	0.4 -0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente oidiosis.	N.A	N.A
Esparrago	0.4 -0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente manchas foliares.	N.A	N.A
Palto	0.4 -0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente cladosporium y hongos de madera.	N.A	N.A
Alcachofa	0.4 -0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente oidiosis, sclerotinia y botritis.	N.A	N.A
Cucurbitáceas (Sandia, melón, pepinillo y zapallo)	0.4 - 0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente oidiosis y botritis.	N.A	N.A
Fresa	0.5	Aplicar en cualquier etapa fenológica del cultivo donde se presente oidiosis y botritis.	N.A	N.A

5. RECOMENDACIONES DE USO

Se recomienda aplicar FUNGIBLOCK utilizando el coadyuvante NUTRIWET SILICONADO y equipo motorizado para garantizar una óptima cobertura y buen mojamiento del producto. Las aplicaciones deben realizarse durante las primeras horas de la mañana, en las horas de menor intensidad lumínica al final del día o durante la noche, lo que asegura una mejor adherencia y efectividad del tratamiento sobre la estructura vegetal.

COMPATIBILIDAD:

FUNGIBLOCK no es compatible con fungicidas a base de azufre, cobre y caldo bordelés.

6. PRESENTACION

Botellas de 1 Litro

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares frescos, lejos de la luz solar directa. Puede ser almacenado en un lugar sin calefacción.

PRECAUCION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

capeagro
Mejor nutrición, mayor protección.

Av. Benavides 2150. Oficina 803.

Telf: 445-5346 Miraflores – Lima
www.capeagro.com