SuperCaB

Fecha de actualización: 18 de mayo de 2026
Versión: 03.0

1. CARACTERISTICAS GENERALES

Ingrediente activo: Microelementos Calcio (Ca) y Boro (B)

Grupo: Nutrientes

Formulación: Polvo soluble (PS)

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SUPER CaB es un fertilizante foliar desarrollado con nanotecnología, formulado con una alta concentración de calcio y boro, complementado con aminoácidos de rápida asimilación, diseñado para cubrir eficientemente los requerimientos nutricionales de los cultivos durante las etapas de mayor demanda fisiológica. Su formulación en nanopartículas favorece una mayor absorción, movilidad y aprovechamiento de los nutrientes dentro de la planta, permitiendo una respuesta rápida y eficiente frente a deficiencias de calcio y boro.

El calcio participa activamente en la formación y estabilidad de las paredes celulares, contribuyendo a mejorar la firmeza, calidad y vida postcosecha de frutos y órganos cosechables. Asimismo, favorece el desarrollo radicular y el adecuado crecimiento de tejidos jóvenes.

El boro cumple un rol fundamental en procesos de división celular, floración, fecundación, cuajado y movilización de azúcares, promoviendo un mejor desarrollo reproductivo y productivo del cultivo

COMPOSICIÓN

Elemento	Concentración
Calcio	22.0%
Boro	3.8%
Aminoácidos	5.0%

3. BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Mejora la firmeza, calidad y vida postcosecha de frutos y órganos cosechables.
- Favorece la división celular y el adecuado desarrollo de tejidos jóvenes, brotes y raíces.
- Estimula la floración, fecundación y cuajado de frutos, mejorando el rendimiento del cultivo.
- Contribuye al transporte y movilización de azúcares y nutrientes dentro de la planta.
- Los aminoácidos favorecen una mayor absorción, translocación y aprovechamiento de los nutrientes aplicados.
- Ayuda a mejorar la tolerancia de la planta frente a condiciones de estrés fisiológico y ambiental, promoviendo mayor vigor y desarrollo del cultivo.

4. CUADRO DE USO

<table>
<tr><th rowspan="2">Cultivo</th><th colspan="2">Dosis</th><th rowspan="2">Forma y momento de aplicación</th></tr>
<tr><th>g/Cil</th><th>g/ha</th></tr>
<tr><td>Arroz, trigo</td><td rowspan="9">50</td><td rowspan="8">50 – 125</td><td>Aplicar en punto de algodón, repetir al inicio del espigado y en pleno desarrollo del grano.</td></tr>
<tr><td>Leguminosas (Soya, Arveja, Caupi, Holantao, Vainita)</td><td>Aplicar en el inicio de floración y repetir durante el llenado de grano.</td></tr>
<tr><td>Maíz, Sorgo, Caña de azúcar</td><td>Aplicar 20 días después de la germinación</td></tr>
<tr><td>Capsicum (Ají, pimiento, páprika, etc.)</td><td>Aplicar desde el inicio de floración, hasta la salida del cultivo en intervalos de 15 a 21días.</td></tr>
<tr><td>Papa</td><td>Aplicar al inicio de la germinación.</td></tr>
<tr><td>Cebolla, ajo</td><td>Aplicar durante el pre bulbeo.</td></tr>
<tr><td>Cucurbitáceas (Sandía, Melón, Pepinillo, Zapallo)</td><td>Aplicar desde el inicio de floración, hasta la salida del cultivo en intervalos de 15 a 21 días.</td></tr>
<tr><td>Frutales (Arándano, Uva, Palta, Maracuyá, Papaya, Mandarina, Piña, Limón, Naranja)</td><td>125 – 200</td><td>Aplicar antes de la floración repetir la aplicación en pleno cuaje de frutos.</td></tr>
</table>

5. RECOMENDACIONES DE USO

APLICACIÓN FOLIAR: Diluir en agua de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta. El momento óptimo de aplicación esta desde inicio de brotamiento y/o inicio de floración con intervalos entre 7 a 15 días entre aplicación. Para mejores resultados, aplicar durante el crecimiento activo del cultivo, después de un riego y programar la aplicación por la mañana o en la tarde.

La frecuencia de aplicación variara de acuerdo a la severidad de la deficiencia, clima, tipo de suelo y método de aplicación. Como recomendación general programar aplicaciones en pre floración y repetir entre los 7 a 15 días entre aplicación.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de herbicidas, insecticidas y fungicidas.

6. PRESENTACION

Sobre de 50 gramos.

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares frescos, lejos de la luz solar directa. Puede ser almacenado en un lugar sin calefacción.

PRECAUCION. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Av. Benavides 2150. Oficina 803.
Telf: 445-5346 Miraflores – Lima
www.capeagro.com